


# HAE - rozmowa z lekarzem wskazówki

Czy występują u Ciebie niekomfortowe bądź bolesne epizody obrzęku?

Tak  Nie

## obszary, gdzie wystąpił obrzęk



## dotatkowe objawy

### skóra

Świąd  Tak  Nie  
 Pokrzywka  Tak  Nie

### jama brzuszna

Obrzęk jamy brzusznej  Tak  Nie  
 Bóle brzucha  Tak  Nie  
 Biegunka  Tak  Nie  
 Nudności  Tak  Nie  
 Wymioty  Tak  Nie

Inne: \_\_\_\_\_

### gardło

Trudności z przełykaniem  Tak  Nie  
 Trudności z oddychaniem  Tak  Nie  
 Zmiana głosu  Tak  Nie

## moje epizody

Czy obrzęk zmniejsza się po zastosowaniu leków przeciwhistaminowych, glikokortykosteroidów i/lub epinefryny?  Tak  Nie

Jak długo zazwyczaj utrzymuje się obrzęk? \_\_\_\_\_

Czy występują jakieś sygnały ostrzegawcze przed obrzękiem (np. zaczerwienienie, nieswędząca wysypka lub mrowienie)?

Czy zaobserwowałeś/-aś, czy obrzęk jest związany z jakimiś czynnikami wywołującymi (np. stres, zakażenie, menstruacja lub uraz)?

## moja historia

Czy podobne objawy występują lub występowały u kogoś w Twojej rodzinie?  Tak  Nie

Kiedy po raz pierwszy wystąpiły u Ciebie objawy (np. w dzieciństwie, w wieku dojrzewania, w życiu dorosłym)?

Liczba wizyt na izbie przyjęć z powodu obrzęku lub bólów brzucha w ostatnim roku

Czy przeprowadzono u Ciebie zabieg chirurgiczny, który nie spowodował zmniejszenia objawów?

## Aktualnie stosowane leki

Materiał dla pacjenta i lekarza przygotowany i sponsorowany przez Takeda.  
 Copyright © 2020 Takeda Pharmaceutical Company Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.  
 Wszystkie znaki handlowe są własnościami ich prawowitych właścicieli.

Shire Polska Sp. z o.o.  
 Shire teraz część grupy Takeda  
 Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa  
 ☎ +48 22 223 03 00 📠 +48 22 223 03 40

